

NOTICE

Notice : information de l'utilisateur

HOMEOPTIC, collyre en solution

Euphrasia officinalis 3 DH, Calendula officinalis 3 DH, Magnesia carbonica 5 CH

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que HOMEOPTIC, collyre en solution et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HOMEOPTIC, collyre en solution
3. Comment utiliser HOMEOPTIC, collyre en solution
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver HOMEOPTIC, collyre en solution
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE HOMEOPTIC, collyre en solution ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathe associant des composants homéopathiques traditionnellement utilisés en cas d'irritation ou de gêne oculaire de diverses origines (sécheresse des muqueuses oculaires, fatigue oculaire, poussières, bain de mer ou de piscine).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER HOMEOPTIC, collyre en solution ?

N'utilisez jamais HOMEOPTIC

- lorsque l'irritation s'accompagne de pus (paupières collées le matin au réveil).
- en cas de douleur vive, de choc direct, de blessure.

Consulter alors rapidement un médecin.

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à une plante de la famille des Astéracées (Composées).

Avvertissements et précautions

A réserver aux affections mineures, si les symptômes augmentent ou persistent plus de deux jours, consulter un médecin.

Autres médicaments et HOMEOPTIC

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

HOMEOPTIC avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament. Il n'existe pas de données sur l'effet d'HOMEOPTIC sur la grossesse et l'allaitement. Aucun effet sur la grossesse et l'allaitement n'est attendu dans la mesure où l'exposition systémique aux substances actives d'HOMEOPTIC est négligeable. Pour autant que l'on sache, ce médicament homéopathique peut être utilisé selon la posologie indiquée au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

HOMEOPTIC n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT UTILISER HOMEOPTIC, collyre en solution ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Voie ophtalmique

1 à 2 gouttes dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour.
Cesser le traitement dès la disparition des symptômes.

- Ouvrir le sachet aluminium.
- Détacher un flacon unidose de la barrette.
- Ouvrir l'unidose en tournant l'embout.
- Tirer la paupière inférieure vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer une goutte de collyre entre la paupière et le globe oculaire (dans le cul-de-sac conjonctival).
- Fermer soigneusement le sachet contenant les autres unidoses en repliant le côté ouvert.

Afin d'utiliser une solution toujours stérile, utiliser une nouvelle unidose lors de chaque application.

Si vous avez l'impression que l'effet d'HOMEOPTIC est trop fort ou trop faible, consulter votre médecin ou pharmacien.

Si vous avez utilisé plus d'HOMEOPTIC que vous n'auriez dû

Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous avez utilisé plus d'HOMEOPTIC que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort. Si vous avez instillé plus de gouttes d'HOMEOPTIC que nécessaire, il n'y a pas d'effets secondaires à prévoir. Si vous avez encore des questions, contactez votre pharmacien, votre médecin ou le Centre Antipoisons (070/ 245 245).

Si vous oubliez d'utiliser HOMEOPTIC

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser HOMEOPTIC

Aucun effet n'est attendu lors de l'arrêt du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Aucun effet indésirable n'est connu.

Déclaration des effets secondaires

Si vous constatez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

Boîte Postale 97

1000 BRUXELLES

Madou

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@afmps.be

Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu

Lien pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HOMEOPTIC, collyre en solution

Pas de précautions particulières de conservation.

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. . Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les quatre suivants l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient HOMEOPTIC

- **Les substances actives sont**

Euphrasia officinalis	3 DH	1 %
Calendula officinalis	3 DH	0,25 %
Magnesia carbonica	5 CH	0,25 %

pour une dose de 0,4 ml.

- **Les autres composants sont** le chlorure de sodium et l'eau purifiée.

Qu'est-ce que HOMEOPTIC et contenu de l'emballage extérieur

Collyre en récipient unidosé sans conservateur, limpide et incolore.

Sachet de 5 unidoses.

Boîte de 10 ou 30 récipients unidoses.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire :

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Fabricant :

BOIRON
1 rue Edouard Buffard
ZAC des Frênes
77144 Montévrain
France

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

HO-BE474533

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 07/2021.